





Tratamento & Prevenção Cicatrizes e Quelóides

Único 100% Silicone Gel disponível no mercado



Excelentes resultados após [3 MESES DE TRATAMENTO]

Scar Clinic™ é o único com adesão, flexibilidade e permeabilidade



■ Scar Clinic™
■ Produto C

• A ação adesiva reforçada permite uma fácil utilização

• A sua flexibilidade permite o uso em várias regiões do corpo

• Baixa permeabilidade e possibilita uma intensa hidratação

• Produto disponível em vários tamanhos

- Previne a formação de quelóide e cicatriz hipertrófica
- Melhora o aspecto da cicatriz
- Fácil aplicação
- Não causa dor ou desconforto
- Pode ser utilizado sob a roupa
- Resistente e reutilizável

O processo de cicatrização ocorre em 3 fases: inflamação, granulação e remodelação da matriz.

Na fase final da cicatrização há remodelação de matriz no local da ferida com proliferação de fibroblastos e depósito de colágeno no novo material para formação da matriz.

O processo de remodelação da síntese de colágeno e lise, podem durar até 2 anos após a lesão tecidual.

Cicatriz Hipertrófica

Representa uma resposta anormal e exagerada da cicatrização após o ferimento da pele.

Quelóide

Geralmente causado por anomalia genética



Aprovado



Representante Exclusivo



RejuveneMedical

Rejuvenating what time takes away!

Av. Prof. Alfonso Bovero, 1.057 - cj. 116

05019-011 - Sumaré - São Paulo/SP


Tel.: 11 3459-5559

Fax.: 11 3459-5539


www.rejuvenemedical.com.br



MÉTODO	CARACTERÍSTICA: INVASIVA, CAUSA IRRITAÇÕES
Cirurgia Plástica	Procedimento mais caro e aumento do risco de formação de quelóide
Injeção de Corticosteróides	Tratamento mais longo (por volta de 8 meses)
Terapia de Alta Pressão	Risco de recorrência
Cryo Terapia	Baixa taxa de eficiência (30%)
Laserterapia	Remove apenas a pigmentação
Radiação	Efeitos colaterais indesejáveis como lesões provenientes do tratamento radioterápico



Scar Clinic e Scar Clinic Thin são produtos que fornecem um ambiente umectante no ferimento



Conclusão: As terapias existentes são caras e de baixa eficácia

TRATAMENTOS

Pós-Queimadura



Pré-Tratamento

Após 3 meses

Cicatriz Hipertrófica



Pré-Tratamento

Após 6 meses

Pós-Cirúrgico



Pré-Tratamento

Após 6 meses



Tamanhos & Indicações

Produto	Cat. Nº.	Tamanho		Indicação
		larg. x compr.	Espessura	
Scar Clinic - Thin	SSU307	3 X 7 Cm	0.4mm	Pequenas cicatrizes, corte simples
	SSU311	3 X 11 Cm		Cicatrizes medianas (Cirurgia de tireóide)
	SSU707	7 X 7 Cm		Após procedimento dermatológico (Laser)
	SSU D30	Diameter: 3Cm (Round Shape)		(formato redondo) - Injeção de BCG, laparoscopia, após remoção de mancha



Tamanhos & Indicações

Produto	Cat. Nº.	Tamanho		Indicação
		larg. x compr.	Espessura	
Scar Clinic - Clear	SCT506	5 X 6 Cm	1.5mm	Pequenas cicatrizes de queimadura, região facial e pequenas incisões
	SCT610	6 X 10 Cm		Pequenas cicatrizes de queimadura, cirurgia de tireóide e cirurgia urológica
	SCT1210	10 X 12 Cm		Cicatrizes medianas de queimadura e cirurgia de joelho
	SCT1215	12 X 15 Cm		Cicatriz grande de queimadura e local de retalhos
	SCT420	4 X 20 Cm		Cesária e cirurgia cardiológica

Representante Exclusivo



Rejuvenating what time takes away!
www.rejuvenemedical.com.br